



PROTOCOLO DE ATENCIÓN ENFERMERÍA CRISIS CONVULSIVA

2026

Colegio San Francisco de Asís

Protocolo de Atención Enfermería

CRISIS CONVULSIVA

La convulsión es actividad eléctrica anormal en el cerebro.

Entre las causas están epilepsia, fiebre alta, lesiones en la cabeza, hipoglicemias, hipocalcemias, entre otras.

La mayoría de las convulsiones duran de 30 segundos a dos minutos.

Los síntomas de una convulsión son:

- Pérdida de conocimiento, seguido por un período de confusión.
- Caída.
- Espuma en la boca.
- Movimientos en los ojos.
- Movimientos en todo el cuerpo.
- Espasmos musculares.
- Relajación de esfínter.
- Alteración de la respiración.



¿Qué hacer?

1. Mantener la calma, habitualmente son autolimitadas.
2. Trate de que los niños que están alrededor se corran, porque se pueden asustar.
3. Ayude a colocarlo en el suelo y corra las cosas con que se pueda golpear.
4. No introducir objetos en la boca.
5. Aflojar el primer botón de camisa o blusa.
6. Importante:
 - a. Tomar el tiempo de duración de la crisis.
 - b. Observe si hay contracción muscular y movimientos involuntarios.
 - c. Si hubo relajación de esfínter.
7. Trasladar al alumno en camilla a la enfermería.
8. Avisar a los padres.
9. Traslado al servicio de urgencias.
10. Hacer seguimiento del alumno de acuerdo a protocolo y preguntar cual fue la causa para realizar estrategias preventivas de una nueva convulsión.